

Прививки: Хочу все знать

Актуальная проблема, волнующая многие медицинские учреждения, заключается в том, что многие родители, вследствие недостаточного объема имеющейся информации, нарушают правила проведения вакцинации своих детей.

Жизнь начинается с прививки

Уже в первые 24 часа после рождения малыша проводят первую вакцинацию – от гепатита В. Несмотря на то, что всех мам проверяют на носительство вируса гепатита во время беременности, он не всегда выявляется. Первая прививка после рождения предотвращает заражение новорожденного в процессе родов, поэтому она крайне важна для ребенка. Перед выпиской из роддома делают еще одну прививку – против туберкулеза.

Для того, чтобы выработать иммунитет к гепатиту В, необходимо повторить нужную прививку в 1 месяц.

В 2 месяца - прививка против пневмококковой инфекции.

3 месяца – возраст для прививок от коклюша, столбняка, полиомиелита, дифтерии. Кроме того, дети должны быть защищены от гемофильной инфекции типа b, которая вызывает опасные заболевания, в том числе пневмонию и гнойные менингиты. Эти же прививки необходимо будет повторить в соответствии с Национальным календарем прививок.

В 6 месяцев делают последнюю прививку против гепатита В, после которой иммунитет к болезни остается на долгие годы.

Прививки защищают детей от опасных и тяжелых болезней. Несмотря на то, что единичные случаи заражений случаются ежегодно, сдерживать их рост позволяет только своевременная массовая вакцинация. Например, в 90-х годах вследствие массовых отказов от иммунизации, вызванных активно распространявшимися научно необоснованными слухами о вреде прививок, случилась настоящая эпидемия дифтерии, которая привела к гибели большого числа непривитых детей и взрослых.

Одна прививка защитит от пяти болезней!

Вследствие недостаточного объема достоверной информации, некоторые мамы могут или вообще отказаться от прививок, или отложить срок вакцинации, посчитав, что прививать малыша сразу от четырех-пяти инфекций одновременно – слишком большая нагрузка на иммунную систему ребенка. Таким мамам нужно знать: делать несколько уколов за один прием совсем не обязательно, а от пяти заболеваний (коклюша, дифтерии, столбняка, полиомиелита и гемофильной инфекции типа b) можно защитить ребенка с помощью всего одной вакцины.

Данная вакцина применяется в полном соответствии с Национальным календарем прививок России, то есть когда малыш будет достигать возраста 3, 4.5, 6 и 18 месяцев.

Календарь прививок детям

РЕГИОНАЛЬНЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ ПРИБИВОК СЕВЕРОКАВКАСКОЙ ОБЛАСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ		
вакцинация проводится в соответствии с инструкцией по применению препарата		
НОВОРОЖДЕННЫЕ в течение 24 часов жизни Гепатит В - 1-ая вакцинация	НОВОРОЖДЕННЫЕ при выписке из родильного дома Туберкулез - вакцинация	1 МЕСЯЦ Гепатит В - 2-ая вакцинация 1а т.ч. для детей из группы риска
2 МЕСЯЦА Гепатит В - 3-я вакцинация для детей из группы риска, Полноценная инфекция - 1-ая вакцинация, Ревакцинация инфекции - 1-ая вакцинация	3 МЕСЯЦА Дифтерия, коклюш, столбняк - 1-ая вакцинация, Полноценная инфекция - 1-ая вакцинация, Полноценная инфекция - 2-ая вакцинация	4,5 МЕСЯЦА Дифтерия, коклюш, столбняк - 2-ая вакцинация, Полиомелит - 2-ая вакцинация, Стоматологическая инфекция - 2-ая вакцинация, Полноценная инфекция - 2-ая вакцинация, Полноценная инфекция - 3-я вакцинация
4 МЕСЯЦЕВ Дифтерия, коклюш, столбняк - 3-я вакцинация, Гепатит В - 3-я вакцинация, Полиомелит - 3-я вакцинация, Пневмококковая инфекция - 3-я вакцинация	9 МЕСЯЦЕВ Менингококковая инфекция - 1-ая вакцинация	11 МЕСЯЦЕВ Менингококковая инфекция - 2-ая вакцинация
15 МЕСЯЦЕВ Корь, краснуха, паротит - вакцинация, Гепатит В - 4-ая вакцинация для детей из группы риска, Ветряная оспа - 1-ая вакцинация	18 МЕСЯЦЕВ Клещевой энцефалит - 1-ая вакцинация Полноценная инфекция - ревакцинация	18 МЕСЯЦЕВ Дифтерия, коклюш, столбняк - 3-я вакцинация, Полиомелит - 3-я вакцинация, Пневмококковая инфекция - ревакцинация
20 МЕСЯЦЕВ Гепатит А - 1-ая вакцинация, "Полноценная" - 2-ая ревакцинация	21 МЕСЯЦЕВ Клещевой энцефалит - 2-ая вакцинация	26 МЕСЯЦЕВ Гепатит А - 2-ая вакцинация
2 ГОДА 4 МЕСЯЦЕВ Клещевой энцефалит - 1-я ревакцинация	4 ЛЕТ Корь, краснуха, паротит - ревакцинация, Ветряная оспа - 2-ая вакцинация	4-7 ЛЕТ Дифтерия, столбняк, коклюш - 2-ая ревакцинация, Туберкулез - ревакцинация
13 ЛЕТ Полноценная инфекция - вакцинация	14 ЛЕТ Дифтерия, столбняк - 3-я ревакцинация, Полноценная - 3-я ревакцинация	ДЕТИ С 6-11 МЕСЯЦЕВ Вакцинация против гриппа - ежегодно

Календарь прививок взрослым

Вакцинация проводится в соответствии с инструкцией по применению препарата

Иммунизация против дифтерии, столбняка:

Ранее не привитым: вакцинация двукратно с интервалом 30 дней, ревакцинация через 6-9 месяцев. Последующие ревакцинации каждые 10 лет.

Ранее привитым: ревакцинация каждые 10 лет с момента последней ревакцинации.

Иммунизация против клещевого энцефалита:

Вакцинация проводится двукратно с интервалом между инъекциями 1-7 месяцев. Первая ревакцинация проводится через 1 год после второй вакцинирующей прививки. Последующие ревакцинации – каждые 3 года. Схема вакцинации зависит от вида вакцины.

Иммунизация против гепатита В:

Взрослым от 18 до 55 лет, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о профилактических прививках против гепатита В по схеме 0-1-6 месяцев.

Медицинские работники – вакцинация без ограничения возраста.

Ревакцинация проводится медицинским работникам по результатам лабораторного обследования; лицам, находящимся на гемодиализе, каждые 3 года.

Иммунизация против гепатита А:

Лицам, проживающим в регионах, неблагополучных по заболеваемости вирусными гепатитами А; лицам, подверженным профессиональному риску заражения.

Схема 0-6(12) месяцев.

Иммунизация против краснухи:

Женщинам от 18 до 25 лет (включительно), не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против краснухи – двукратно с интервалом 3 месяца.

Привитым однократно против краснухи – однократно.

Иммунизация против ветряной оспы:

Взрослым из групп риска, ранее не привитым и не болевшим ветряной оспой: пациенты с тяжелыми хроническими заболеваниями, женщины, планирующие беременность, лица, подлежащие призыву на военную службу, медицинские работники, работники образовательных организаций и организаций стационарного социального обслуживания, лица, выезжающие в загородные оздоровительные учреждения.

Схема 0-4(8) недель.

Иммунизация против кори:

Взрослым до 35 лет (включительно), не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против кори – двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

Взрослым до 35 лет (включительно), имеющим одну прививку – однократно.

Взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группе риска: работники медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, организаций торговли, транспорта, коммунальной и социальной сферы; лица, работающие вахтовым методом, и сотрудники государственных контрольных органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ – двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

Взрослым без ограничения возраста: работникам медицинских организаций, осуществляющих образовательную деятельность, не болевшим, не привитым и не имеющим сведений о прививках против кори – двукратно с интервалом не менее 3 месяцев.

Иммунизация против папилломавирусной инфекции:

Женщинам от 18 до 45 лет, схема вакцинации зависит от применяемой вакцины.

Иммунизация против шигеллезов:

Лицам, подверженным профессиональному риску заражения. Однократно, ежегодно.

Иммунизация против гриппа: ежегодно, до начала эпидемического сезона.

Взрослым, работающим по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских, образовательных организаций, транспорта, торговли, коммунальной сферы, социального обслуживания, сотрудники правоохранительных органов, люди, работающие вахтовым методом, сотрудники государственных контролирующих органов в пунктах пропуска через государственную границу РФ, государственные гражданские и муниципальные служащие)

Студентам

Беременным женщинам

Взрослым старше 60 лет

Лицам, подлежащим призыву на военную службу

Лицам с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением

Работникам профессиональных групп риска (работники общепита, промышленных предприятий, птицеводческих хозяйств)

Прочим взрослым

Иммунизация против коклюша:

Взрослым ревакцинация каждые 10 лет, к приоритетным группам относятся: работники медицинских и образовательных учреждений, учреждений социального обеспечения, лица с хронической бронхолегочной патологией, с иммунодефицитными состояниями, взрослые в семьях, где есть новорожденные и не привитые дети до 1 года жизни, женщины, планирующие беременность, военнослужащие.

Иммунизация против пневмококковой инфекции:

Лицам из группы риска, в том числе с хроническими заболеваниями.

Взрослым старше 60 лет, проживающим в организациях социального обслуживания, лицам, подлежащим призыву на военную службу.

Иммунизация против менингококковой инфекции:

Лицам, подлежащим призыву на военную службу, лицам из групп риска.

Иммунизация против коронавирусной инфекции:

Все население, включая группы риска по приоритетам. 1 раз в 6 месяцев – по эпидемическим показаниям, ежегодно – при «рутинной» вакцинации.

Как сделать прививку в Белоярской ЦРБ?

Прививки ставятся в районной больнице и структурных подразделениях по месту жительства. Прививочный кабинет поликлиники (Белоярский, Юбилейная, 13А) работает ежедневно в будни с 9.00 до 14.00. Предварительная запись не требуется.

Также Белоярская ЦРБ практикует "выездную вакцинацию" в коллективы организаций и предприятий по заявкам руководителей. Тел. 8 (34377) 2-12-13 (доб. 3), эл. почта: btcrb@mail.ru.

Наиболее полную информацию о прививках можно получить на сайте privivka.ru .
