

Какие прививки нужны самым маленьким?

Автор: Исполнитель
29.04.2024 09:04 -

Вакцинация в роддоме:

Прививка против вирусного гепатита В проводится через 12 часов после рождения ребенка. Она ставится внутримышечно в переднюю поверхность бедра ребенка

На 3-5 день жизни новорожденному проводят вакцинацию против туберкулеза вакциной БЦЖ. Прививка выполняется внутривенно в верхнюю часть плеча левой руки.

График прививок по месяцам детям до года:

1 месяц – против вирусного гепатита В – вторая вакцинация.

2 месяц – вакцинация против пневмококковой инфекции.

2-3 месяц – первая комплексная вакцинация против коклюша, столбняка, дифтерии, одновременно делают первую прививку против полиомиелита.

4-5 месяцев – вторая вакцинация от дифтерии, коклюша, плюс повторная прививка от полиомиелита.

6 месяцев – третья прививка против дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита; от вирусного гепатита В – третья вакцинация.

Какие прививки нужны самым маленьким?

Автор: Исполнитель
29.04.2024 09:04 -

12 месяцев – вакцинация от кори, краснухи, эпидемического паротита.

Прививки младенцам необходимы как для защиты здоровья самого ребенка, так и для обеспечения инфекционной безопасности нации в целом.

